

AVERTISSEMENTS

DLP 14-3-84327525
AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

(95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 27
du 06 MARS 1984.

VIGNE

. Excoriose

Les traitements d'hiver à base d'arsenite de soude doivent être terminés 2 semaines avant le débourrement. Ne tardez pas. Le traitement de post-débourrement est possible. Il fera l'objet d'un prochain Bulletin.

. Flavescence dorée

Dans les régions où cette maladie est présente, il faut brûler les pieds de vigne arrachés. Ceux-ci abritent, en effet, des œufs de Cicadelle qui transmettent cette maladie.

ABRICOTIERS

. Monilia sur abricotiers

Sur les espèces sensibles, ou lorsque les attaques ont été importantes l'an passé, on envisagera un traitement à chaque stade de la floraison.



On voit la corolle



On voit les étamines



Fleur ouverte

Si les attaques ont été plus modérées, on se limitera à 2 interventions au stade **E** et **F**. On utilisera les matières actives suivantes (en g. /hl)

Benomyl	30 g	Benlate	
Carbendazime	30 g	Nombreuses spécialités	
Triforine	35 g	Funginex, Saprol, Denarin	
(également efficace contre Oïdium)			
Vinchlozoline	50 g	Ronilan	
Thirame	200 g	N. S.	
Iprodione	75	Rovral	
Captafol + Carbendazime	80 + 20	Ceretal liquide	



Monilioses : fruit momifié

O R G E

Les pluies récentes sont favorables au développement de **Rhynchosporiose** et **Oïdium**. La Rhynchosporiose se traduit par des taches gris clair, bordées de brun, l'Oïdium par un feutrage superficiel blanc. Le traitement fongicide sera réalisé en cours de montaison avec les spécialités suivantes :

Contre la Rhynchosporiose : nombreuses spécialités à base de Carbendazime, ainsi que les produits commerciaux : Tilt 125, Sportak, Bayleton, Peltar.

Contre l'Oïdium : On utilisera les spécialités suivantes : Vigil, Rubigan, Corbel, Sportak, Tilt, Bayleton, Calixine, Saprol, Funginex, Denarin, ainsi que les spécialités à base de soufre micronisé mouillable.

T O M A T E S


LUTTE CONTRE LES INSECTES DU SOL

De nombreux dégâts dus aux **Taupins** sont enregistrés chaque année. Les **vers fil de fer** dévorent les jeunes racines et peuvent anéantir toute une plantation.



Vers fil de fer
= taupin

Attaque de vers
gris



Ce traitement vise à détruire les **Taupins** (**vers "fil de fer"**). Il détruit aussi les **Hannetons** (**Vers blancs**) et contrôle éventuellement les attaques précoces de **Vers gris** :

Si le risque est élevé : Précédents culturaux : prairie, luzerne, friches, blé, sorgho. Sols meubles, frais ou irrigués, profonds. Bosquets à proximité, effectuer un **TRAITEMENT GENERALISE** au lindane à la dose de 500 g de M. A./ha. Le produit sera **incorporé** au sol sur 15 cm au moins, et ce **3 semaines avant plantation**.

Si le risque est faible : 2 solutions sont possibles : - effectuer un traitement localisé avec un produit granulé sur la ligne de plantation (0,40 m de large) suivi d'une incorporation sur 15 cm au moins.

Produits utilisables :

<u>Matière active</u>	<u>Produit commercial</u>	<u>Traitement localisé dose g.M.A./ha</u>
Chlorméphos	Dotan	750
Chlorpyrifos	Dursban	800
Diazison	Basudine, Umuter	2500
Fonofos	Dyfonate	1000
Phoxime	Volaton, Agridine	1250
Trichloronate	Phytosal	1250

- Ajouter un insecticide à l'eau du réservoir de la planteuse. Les doses sont indiquées pour 2000 litres de solution / ha.

Produits utilisables :

<u>Matière active</u>	<u>Produit commercial</u>	<u>Traitement localisé dose g. M.A./ha</u>
Parathion méthyl	Nombreuses spécialités	30
Trichloronate	Phytosal	25